

**JE ME
PROTÈGE,
JE ME
VACCINE!**



GPIC





JE ME PROTÈGE, JE ME VACCINE!



Suis-je plus sensible aux infections ?




Le cancer et les traitements affaiblissent vos défenses immunitaires et favorisent certaines infections dont certaines peuvent nécessiter une hospitalisation.

A quel moment dois-je me faire vacciner ?



L'idéal est de réaliser les vaccins avant le début du traitement par chimiothérapie, mais la vaccination peut également intervenir entre 2 cures. Un rappel de l'ensemble de vos vaccins sera également nécessaire 3 à 6 mois après la fin des traitements.

Comment puis-je me protéger contre ces infections ?



La vaccination peut vous protéger contre certaines infections. Tout d'abord, vérifiez avec votre médecin généraliste que vos vaccinations sont bien à jour. Il vous est recommandé d'être vacciné contre le pneumocoque et de réaliser le vaccin contre la grippe chaque année pendant toute la durée de votre traitement.

Y a-t-il des risques à se faire vacciner ?



Les vaccins proposés sont très bien tolérés.

Mes proches doivent-ils se faire vacciner ?



Il est important que votre entourage se vaccine contre la grippe. Ainsi, vous serez moins exposé(e) au risque d'infection.



LA VACCINATION EST PRIMORDIALE : ELLE PERMET DE VOUS PROTÉGER CONTRE CERTAINES INFECTIONS



Vérifiez avec votre
médecin traitant
que vos vaccinations
sont bien à jour



Parlez des vaccins contre
la grippe et les infections
à pneumocoques à votre
équipe soignante :
médecin généraliste,
oncologue



En fin de traitement,
un rappel
de vos vaccins
est nécessaire



En se vaccinant,
vos proches
se protègent et vous
protègent aussi